


Règles pour les SIE « jachères » en 2022

Pour être valorisée en SIE, une jachère doit être présente sur la période **du 1^{er} mars au 31 août inclus OU du 15 avril au 15 octobre inclus** pour une jachère mellifère.

Sur cette période de présence obligatoire, il n'est pas possible de valoriser le couvert (pas de fauche pour la récolte, ni de pâture). L'entretien doit être réalisé par broyage ou fauche (en laissant les résidus sur place).

L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est également impossible pendant la période de présence obligatoire. Illustration (jachère non mellifère) :



Quelques rappels concernant toutes les jachères (SIE ou non – mellifère ou non) :

- Le couvert d'une jachère doit être composé uniquement d'espèces autorisées (voir listes au dos). Cependant :
 - o Les repousses de cultures sont tolérées sous réserve qu'elles soient suffisamment couvrantes.
 - o Tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole » est également autorisé.
- La présence de ruches sur une parcelle déclarée en jachère n'est pas considérée comme une valorisation du couvert.
- Une **période d'interdiction de broyage** ou fauche doit être respectée sur une période de **40 jours** consécutifs définie par arrêté préfectoral. En 2022, cette période s'étendait **du 16 mai au 24 juin inclus**.

Zoom sur la jachère mellifère :

Sous réserve de certaines conditions, les **jachères mellifères** peuvent être prises en compte comme SIE, avec un coefficient de pondération de **1,5 ha de SIE pour 1 ha déclaré** (rappel : pour une jachère classique, 1ha = 1ha de SIE).

Pour pouvoir être déclaré comme jachère mellifère - en plus des règles d'entretien applicables à la jachère et rappelées dans la présente fiche - le couvert doit être composé au minimum de 5 espèces mellifères appartenant exclusivement à la liste des espèces mellifères autorisées (voir liste au dos).

Le couvert doit être présent du 15 avril au 15 octobre inclus.

Adapté d'un document conçu par le Service Politiques Agricoles et Filières de l'APCA

Liste des espèces autorisées pour les jachères (non mellifères)

brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.

Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.

Liste nationale des espèces mellifères pour les jachères mellifères déclarées en SIE

| NOM | GENRE / ESPÈCE | NOM | GENRE / ESPÈCE |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Achillée | <i>Achillea millefolium</i> | Onagre bisannuelle | <i>Oenothera biennis</i> |
| Agastache fenouil, Hysopé anisée | <i>Agastache foeniculum</i> | Origan commun | <i>Origanum vulgare</i> |
| Bleuet des moissons | <i>Cyanus segetum</i> | Phacélie à feuilles de Tanaisie | <i>Phacelia tanacetifolia</i> |
| Bourrache officinale | <i>Borago officinalis</i> | Pulmonaire officinale | <i>Pulmonaria officinalis</i> |
| Campanules | <i>Campanula spp.</i> | Sainfoin, Esparcette | <i>Onobrychis viciifolia</i> |
| Centaurées de Timbal | <i>Centaurea spp.</i> | Sarrasin | <i>Fagopyrum esculentum</i> |
| Consoude des marais | <i>Symphytum officinale</i> | Sauges | <i>Salvia spp.</i> |
| Coquelicot | <i>Papaver rhoeas</i> | Scabieuses | <i>Scabiosa spp.</i> |
| Féverole, Fève | <i>Vicia faba</i> | Souci | <i>Calendula officinalis</i> |
| Gesse | <i>Lathyrus sativus</i> | Trèfle d'Alexandrie | <i>Tribolium alexandrinum</i> |
| Knautie, Scabieuse | <i>Knautia spp.</i> | Trèfle hybride | <i>Tribolium hybridum</i> |
| Lotier corniculé | <i>Lotus corniculatus</i> | Trèfle incarnat | <i>Tribolium incarnatum</i> |
| Luzerne | <i>Medicago sativa</i> | Trèfle rampant | <i>Tribolium repens</i> |
| Luzerne lupuline, Minette | <i>Medicago lupulina</i> | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | <i>Tribolium resupinatum</i> |
| Marguerite | <i>Leucanthemum vulgare</i> | Trèfle violet, Trèfle des prés | <i>Tribolium pratense</i> |
| Mauve alcée | <i>Malva alcea</i> | Valérianes | <i>Valeriana spp.</i> |
| Mauve musquée | <i>Malva moschata</i> | Verveine officinale | <i>Verbena officinalis</i> |
| Mauve sauvage, Grande mauve | <i>Malva sylvestris</i> | Vesces | <i>Vicia spp.</i> |
| Mélilots | <i>Trigonella spp.</i> | Vipérine commune | <i>Echium vulgare</i> |
| Nigelle de Damas | <i>Nigella damascena</i> | | |